お詫びと訂正

本誌第62巻第3号（3月増大号）437ページ以下に掲載いたしました論文【反復帝王切開時におけるセプラフィルム®の有効性について】に，下記の通り記載に誤りがございましたので，ここにお詫び申し上げ，以下の通り訂正させていただきます。

<table>
<tr><th></th><th>【誤】</th><th>【正】</th></tr>
<tr><td>p.438
表1</td><td>表1 対象症例
<table><tr><th>セプラフィルム®</th><th>症例数</th><th>年齢（歳）</th></tr><tr><td>使用例の2回目帝王切開</td><td>27</td><td>31.2（20～40）</td></tr><tr><td>非使用例の2回目帝王切開</td><td>25</td><td>31.4（24～39）</td></tr><tr><td>使用例の3回目帝王切開</td><td>27</td><td>31.2（20～40）</td></tr></table></td><td>表1 対象症例
<table><tr><th>セプラフィルム®</th><th>症例数</th><th>年齢（歳）</th></tr><tr><td>使用例の2回目帝王切開</td><td>45</td><td>31.8（20～43）</td></tr><tr><td>非使用例の2回目帝王切開</td><td>25</td><td>31.4（24～39）</td></tr><tr><td>使用例の3回目帝王切開</td><td>9</td><td>33.2（31～38）</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>p.438
本文左段
21～22行目</td><td>出血量は羊水を含むものであり，3者に有意差はなかったが，</td><td>出血量は羊水を含むものであり，使用例2回目で有意に少なかった。</td></tr>
</table>

『産婦人科の実際』編集室