

正誤表

雑誌「皮膚科の臨床」第67巻4号（2025年4月号）に誤りがございました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。

2025年6月金原出版株式会社

記

頁	訂正箇所	誤	正
445	右段 下から3行目	自験例を除く3例で皮内テストが行われ、 そのうち2例では	自験例を除く2例で皮内テストが行われ、 そのうち1例では

頁	訂正箇所	誤																																																																																																																		
445	表 1	<table><tr><th>年齢/性別</th><th>手術内容</th><th>原因</th><th>投与から症状出現時間</th><th>症状</th><th>アレルギー検査</th></tr><tr><td>14/女^{d)}</td><td>選択的迷走神経切断術 および嚥門閉切除術</td><td>ヘスバンダー[®]</td><td>15 分</td><td>顔面潮紅、気道内圧上昇、 喘鳴、SpO₂低下</td><td>・皮内テスト 陽性</td></tr><tr><td>45/男^{b)}</td><td>弓部大動脈瘤切除 人工血管置換術</td><td>ヘスバンダー[®]</td><td>5 分</td><td>血圧低下</td><td>記載なし</td></tr><tr><td>28/女^{d)}</td><td>帝王切開</td><td>ヘスバンダー[®]</td><td>10 分</td><td>咳嗽、呼吸苦、SpO₂低下、 顔面発赤</td><td>・皮内テスト 1/100 濃 度、1/10 濃度で陽性 ・BAT 1時間接触で1/ 8、1/2 で陽性</td></tr><tr><td>年齢不詳/男*</td><td>整形外科の手術（詳細 不明）</td><td>ヘスバンダー[®]</td><td>投与直後</td><td>血圧低下</td><td>記載なし</td></tr><tr><td>28/女*</td><td>帝王切開術</td><td>サリンヘス[®]</td><td>数分後（詳細 不明）</td><td>呼吸困難感、顔面潮紅、 SpO₂低下</td><td>・皮内テスト 1/100 濃 度で陽性 ・BAT 1時間接触で陽 性</td></tr><tr><td>70/男*</td><td>神経外科での手術 （詳細不明）</td><td>サリンヘス[®]</td><td>1 分</td><td>呼吸停止、上半身痙攣</td><td>記載なし</td></tr><tr><td>20/女*</td><td>帝王切開術</td><td>サリンヘス[®]</td><td>半分投与した 時点（詳細不 明）</td><td>呼吸困難、喘鳴、意識脱離</td><td>記載なし</td></tr><tr><td>80/男*</td><td>経尿道的前立腺切除</td><td>ボルベン[®]</td><td>直後</td><td>血圧低下、紅斑</td><td>記載なし</td></tr><tr><td>76/男*</td><td>膀胱癌手術</td><td>ボルベン[®]</td><td>投与後（詳細 不明）</td><td>アナフィラキシーショック （詳細不明）</td><td>記載なし</td></tr><tr><td>41/女*</td><td>帝王切開術</td><td>ボルベン[®]</td><td>詳細不明</td><td>全身潮紅</td><td>調査協力得られず、調査 終了</td></tr><tr><td>31/女*</td><td>帝王切開術</td><td>ボルベン[®]</td><td>投与直後</td><td>顔面痙攣</td><td>記載なし</td></tr><tr><td>36/女*</td><td>帝王切開術</td><td>ボルベン[®]</td><td>15 分後</td><td>呼吸苦、両肺陰浮腫、SpO₂ 低下</td><td>記載なし</td></tr><tr><td>28/女*</td><td>帝王切開術</td><td>ボルベン[®]</td><td>10 分後</td><td>湿性咳嗽、呼吸苦、顔面発 赤、SpO₂ 低下</td><td>記載なし</td></tr><tr><td>48/女*</td><td>右上葉肺癌に対する手 術</td><td>ボルベン[®]</td><td>3 分後</td><td>顔面・上肢潮紅、血圧低下</td><td>記載なし</td></tr><tr><td>48/女*</td><td>帝王切開術</td><td>ボルベン[®]</td><td>詳細不明</td><td>血圧低下</td><td>記載なし</td></tr><tr><td>71/男*</td><td>右下肢急性動脈閉塞</td><td>ボルベン[®]</td><td>詳細不明</td><td>投与部の発赤出現</td><td>記載なし</td></tr><tr><td>23/男^{d)}</td><td>右半月板損傷に対し右 膝関節内視鏡術</td><td>HES 製剤である が、商品名記載 なし</td><td>5 分</td><td>血圧低下、心拍数上昇、気 道内圧上昇</td><td>皮膚テストを患者が希望 せず、施行していない</td></tr><tr><td>38/女 （自験例）</td><td>帝王切開術</td><td>ボルベン[®]</td><td>9 分</td><td>嘔吐、血圧低下</td><td>・ブリックテスト 陽性 ・皮内テスト 1/100 濃 度、1/10 濃度で陽性</td></tr></table> HES 製剤：ヒドロキシエチルデンプン含有製剤、BAT：basophil activation test（好塩基球活性化試験） *大塚製薬株式会社より情報を提供	年齢/性別	手術内容	原因	投与から症状出現時間	症状	アレルギー検査	14/女 ^{d)}	選択的迷走神経切断術 および嚥門閉切除術	ヘスバンダー [®]	15 分	顔面潮紅、気道内圧上昇、 喘鳴、SpO ₂ 低下	・皮内テスト 陽性	45/男 ^{b)}	弓部大動脈瘤切除 人工血管置換術	ヘスバンダー [®]	5 分	血圧低下	記載なし	28/女 ^{d)}	帝王切開	ヘスバンダー [®]	10 分	咳嗽、呼吸苦、SpO ₂ 低下、 顔面発赤	・皮内テスト 1/100 濃 度、1/10 濃度で陽性 ・BAT 1時間接触で1/ 8、1/2 で陽性	年齢不詳/男*	整形外科の手術（詳細 不明）	ヘスバンダー [®]	投与直後	血圧低下	記載なし	28/女*	帝王切開術	サリンヘス [®]	数分後（詳細 不明）	呼吸困難感、顔面潮紅、 SpO ₂ 低下	・皮内テスト 1/100 濃 度で陽性 ・BAT 1時間接触で陽 性	70/男*	神経外科での手術 （詳細不明）	サリンヘス [®]	1 分	呼吸停止、上半身痙攣	記載なし	20/女*	帝王切開術	サリンヘス [®]	半分投与した 時点（詳細不 明）	呼吸困難、喘鳴、意識脱離	記載なし	80/男*	経尿道的前立腺切除	ボルベン [®]	直後	血圧低下、紅斑	記載なし	76/男*	膀胱癌手術	ボルベン [®]	投与後（詳細 不明）	アナフィラキシーショック （詳細不明）	記載なし	41/女*	帝王切開術	ボルベン [®]	詳細不明	全身潮紅	調査協力得られず、調査 終了	31/女*	帝王切開術	ボルベン [®]	投与直後	顔面痙攣	記載なし	36/女*	帝王切開術	ボルベン [®]	15 分後	呼吸苦、両肺陰浮腫、SpO ₂ 低下	記載なし	28/女*	帝王切開術	ボルベン [®]	10 分後	湿性咳嗽、呼吸苦、顔面発 赤、SpO ₂ 低下	記載なし	48/女*	右上葉肺癌に対する手 術	ボルベン [®]	3 分後	顔面・上肢潮紅、血圧低下	記載なし	48/女*	帝王切開術	ボルベン [®]	詳細不明	血圧低下	記載なし	71/男*	右下肢急性動脈閉塞	ボルベン [®]	詳細不明	投与部の発赤出現	記載なし	23/男 ^{d)}	右半月板損傷に対し右 膝関節内視鏡術	HES 製剤である が、商品名記載 なし	5 分	血圧低下、心拍数上昇、気 道内圧上昇	皮膚テストを患者が希望 せず、施行していない	38/女 （自験例）	帝王切開術	ボルベン [®]	9 分	嘔吐、血圧低下	・ブリックテスト 陽性 ・皮内テスト 1/100 濃 度、1/10 濃度で陽性
年齢/性別	手術内容	原因	投与から症状出現時間	症状	アレルギー検査																																																																																																															
14/女 ^{d)}	選択的迷走神経切断術 および嚥門閉切除術	ヘスバンダー [®]	15 分	顔面潮紅、気道内圧上昇、 喘鳴、SpO ₂ 低下	・皮内テスト 陽性																																																																																																															
45/男 ^{b)}	弓部大動脈瘤切除 人工血管置換術	ヘスバンダー [®]	5 分	血圧低下	記載なし																																																																																																															
28/女 ^{d)}	帝王切開	ヘスバンダー [®]	10 分	咳嗽、呼吸苦、SpO ₂ 低下、 顔面発赤	・皮内テスト 1/100 濃 度、1/10 濃度で陽性 ・BAT 1時間接触で1/ 8、1/2 で陽性																																																																																																															
年齢不詳/男*	整形外科の手術（詳細 不明）	ヘスバンダー [®]	投与直後	血圧低下	記載なし																																																																																																															
28/女*	帝王切開術	サリンヘス [®]	数分後（詳細 不明）	呼吸困難感、顔面潮紅、 SpO ₂ 低下	・皮内テスト 1/100 濃 度で陽性 ・BAT 1時間接触で陽 性																																																																																																															
70/男*	神経外科での手術 （詳細不明）	サリンヘス [®]	1 分	呼吸停止、上半身痙攣	記載なし																																																																																																															
20/女*	帝王切開術	サリンヘス [®]	半分投与した 時点（詳細不 明）	呼吸困難、喘鳴、意識脱離	記載なし																																																																																																															
80/男*	経尿道的前立腺切除	ボルベン [®]	直後	血圧低下、紅斑	記載なし																																																																																																															
76/男*	膀胱癌手術	ボルベン [®]	投与後（詳細 不明）	アナフィラキシーショック （詳細不明）	記載なし																																																																																																															
41/女*	帝王切開術	ボルベン [®]	詳細不明	全身潮紅	調査協力得られず、調査 終了																																																																																																															
31/女*	帝王切開術	ボルベン [®]	投与直後	顔面痙攣	記載なし																																																																																																															
36/女*	帝王切開術	ボルベン [®]	15 分後	呼吸苦、両肺陰浮腫、SpO ₂ 低下	記載なし																																																																																																															
28/女*	帝王切開術	ボルベン [®]	10 分後	湿性咳嗽、呼吸苦、顔面発 赤、SpO ₂ 低下	記載なし																																																																																																															
48/女*	右上葉肺癌に対する手 術	ボルベン [®]	3 分後	顔面・上肢潮紅、血圧低下	記載なし																																																																																																															
48/女*	帝王切開術	ボルベン [®]	詳細不明	血圧低下	記載なし																																																																																																															
71/男*	右下肢急性動脈閉塞	ボルベン [®]	詳細不明	投与部の発赤出現	記載なし																																																																																																															
23/男 ^{d)}	右半月板損傷に対し右 膝関節内視鏡術	HES 製剤である が、商品名記載 なし	5 分	血圧低下、心拍数上昇、気 道内圧上昇	皮膚テストを患者が希望 せず、施行していない																																																																																																															
38/女 （自験例）	帝王切開術	ボルベン [®]	9 分	嘔吐、血圧低下	・ブリックテスト 陽性 ・皮内テスト 1/100 濃 度、1/10 濃度で陽性																																																																																																															
		正																																																																																																																		
		*印の症例と説明を削除 <table><tr><th>年齢/性別</th><th>手術内容</th><th>原因</th><th>投与から症状出現時間</th><th>症状</th><th>アレルギー検査</th></tr><tr><td>14/女^{d)}</td><td>選択的迷走神経切断術 および嚥門閉切除術</td><td>ヘスバンダー[®]</td><td>15 分</td><td>顔面潮紅、気道内圧上昇、 喘鳴、SpO₂低下</td><td>・皮内テスト 陽性</td></tr><tr><td>45/男^{b)}</td><td>弓部大動脈瘤切除 人工血管置換術</td><td>ヘスバンダー[®]</td><td>5 分</td><td>血圧低下</td><td>記載なし</td></tr><tr><td>28/女^{d)}</td><td>帝王切開</td><td>ヘスバンダー[®]</td><td>10 分</td><td>咳嗽、呼吸苦、SpO₂低下、 顔面発赤</td><td>・皮内テスト 1/100 濃 度、1/10 濃度で陽性 ・BAT 1時間接触で1/ 8、1/2 で陽性</td></tr><tr><td>23/男^{d)}</td><td>右半月板損傷に対し右 膝関節内視鏡術</td><td>HES 製剤である が、商品名記載 なし</td><td>5 分</td><td>血圧低下、心拍数上昇、気 道内圧上昇</td><td>皮膚テストを患者が希望 せず、施行していない</td></tr><tr><td>38/女 （自験例）</td><td>帝王切開術</td><td>ボルベン[®]</td><td>9 分</td><td>嘔吐、血圧低下</td><td>・ブリックテスト 陽性 ・皮内テスト 1/100 濃 度、1/10 濃度で陽性</td></tr></table> HES 製剤：ヒドロキシエチルデンプン含有製剤、BAT：basophil activation test（好塩基球活性化試験）	年齢/性別	手術内容	原因	投与から症状出現時間	症状	アレルギー検査	14/女 ^{d)}	選択的迷走神経切断術 および嚥門閉切除術	ヘスバンダー [®]	15 分	顔面潮紅、気道内圧上昇、 喘鳴、SpO ₂ 低下	・皮内テスト 陽性	45/男 ^{b)}	弓部大動脈瘤切除 人工血管置換術	ヘスバンダー [®]	5 分	血圧低下	記載なし	28/女 ^{d)}	帝王切開	ヘスバンダー [®]	10 分	咳嗽、呼吸苦、SpO ₂ 低下、 顔面発赤	・皮内テスト 1/100 濃 度、1/10 濃度で陽性 ・BAT 1時間接触で1/ 8、1/2 で陽性	23/男 ^{d)}	右半月板損傷に対し右 膝関節内視鏡術	HES 製剤である が、商品名記載 なし	5 分	血圧低下、心拍数上昇、気 道内圧上昇	皮膚テストを患者が希望 せず、施行していない	38/女 （自験例）	帝王切開術	ボルベン [®]	9 分	嘔吐、血圧低下	・ブリックテスト 陽性 ・皮内テスト 1/100 濃 度、1/10 濃度で陽性																																																																														
年齢/性別	手術内容	原因	投与から症状出現時間	症状	アレルギー検査																																																																																																															
14/女 ^{d)}	選択的迷走神経切断術 および嚥門閉切除術	ヘスバンダー [®]	15 分	顔面潮紅、気道内圧上昇、 喘鳴、SpO ₂ 低下	・皮内テスト 陽性																																																																																																															
45/男 ^{b)}	弓部大動脈瘤切除 人工血管置換術	ヘスバンダー [®]	5 分	血圧低下	記載なし																																																																																																															
28/女 ^{d)}	帝王切開	ヘスバンダー [®]	10 分	咳嗽、呼吸苦、SpO ₂ 低下、 顔面発赤	・皮内テスト 1/100 濃 度、1/10 濃度で陽性 ・BAT 1時間接触で1/ 8、1/2 で陽性																																																																																																															
23/男 ^{d)}	右半月板損傷に対し右 膝関節内視鏡術	HES 製剤である が、商品名記載 なし	5 分	血圧低下、心拍数上昇、気 道内圧上昇	皮膚テストを患者が希望 せず、施行していない																																																																																																															
38/女 （自験例）	帝王切開術	ボルベン [®]	9 分	嘔吐、血圧低下	・ブリックテスト 陽性 ・皮内テスト 1/100 濃 度、1/10 濃度で陽性																																																																																																															